

# UN RHODODENDRON A FLORAISON TARDIVE : *R. CONCINNOIDES*

Par J.F. Petton

Il fut découvert en août 1928 par F. Kingdon-Ward en Assam et décrit en 1931 par Hutchinson et Kingdon-Ward dans « Notes Roy. Bot. Gard. Edinburg » D'abord il fut classé dans la sous-section *Maddenia* puis dans la sous-section *Triflora* et enfin dans les *Monantha*. Cela ne fait cependant pas l'unanimité.



Exemplaire de *R. concinnoides* dans l'herbier de Kew Garden, d'après EOL,  
source Jardin Botanique d'Edimbourg

Il est lépidote, très souvent épiphyte, pousse entre 2300m et 3300m et fleurit tardivement. K. Rushforth l'a vu en pleines fleurs dans la nature début octobre Mon exemplaire a fleuri au 10 novembre. Ce caractère le rend intéressant pour les hybrideurs.



Les feuilles mesurent 2cm de long et 1,5cm de large. Elles sont vert-foncé sur le dessus et gris-brun en dessous car il y a un grand nombre d'écailles.



Curiosité donc à plus d'un titre :

Il est épiphyte

Ignoré depuis 1928 jusqu'en 2005

Floraison tardive

Incertitude pour le classer : Monantha ou Triflora ?